

## Què cal saber

**Segona dosi de vacuna en persones menors de 60 anys que han rebut una primera dosi de vacuna d'Oxford-AstraZeneca (Vaxzevria).**



### **1. La pauta completa són dues dosis. Cal rebre la segona dosi per obtenir el màxim benefici de les vacunes.**

Amb una única dosi de vacuna s'eviten entre 6 i 7 de cada 10 casos simptomàtics de COVID-19, i amb les dues dosis entre 8 i 9 de cada 10.

L'administració de la segona dosi és especialment important per augmentar la protecció contra les noves variants del virus, entre les quals la B.1.617 identificada a l'Índia.

La segona dosi també és fonamental per a la durada de la protecció.

### **2. Aquesta segona dosi s'ha de rebre quan rebeu avis per SMS (per citar-vos a través de la web i el més a prop possible a les 12 setmanes de la primera dosi).**

Si s'endarrereix massa, pot haver-hi una disminució de la protecció. En el moment en què rebeu l'SMS, és molt important que us apunteu de seguida per tal de posar-vos la segona dosi sense superar les 16 setmanes.

### **3. Se us oferirà com a segona dosi una vacuna de Pfizer-BioNTech, que és la proposada per l'Estratègia estatal (no cal signar un consentiment informat).**

El Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut recomana que la segona dosi sigui de la vacuna de Pfizer-BioNTech (Comirnaty) perquè:

- Hi ha estudis clínics on han participat centenars de persones que mostren que la resposta immunitària és molt bona i no s'han observat reaccions adverses greus.
- Altres països (com França i Alemanya) ho estan aplicant.

### **4. Podeu optar a continuar la vostra vacunació amb Oxford-AstraZeneca**

L'Agència Europea del Medicament i l'Organització Mundial de la Salut recomanen que aquesta segona dosi sigui amb Oxford-AstraZeneca (Vaxzevria) perquè:

- La fitxa tècnica aprovada per aquesta vacuna només recull administrar les dues dosis de la mateixa vacuna.



- Els estudis clínics, on han participat milers de persones mostren una bona eficàcia de la vacuna i un perfil adequat de reaccions adverses.
- La relació risc-benefici és bona. Els beneficis en la població de prevenir la COVID-19 són superiors als riscos associats a la vacunació.
- La majoria dels països estan aplicant aquesta opció (per exemple, Regne Unit, Itàlia), que és també la que s'utilitzarà a Espanya en persones de 60 a 69 anys.
- El Regne Unit és l'estat amb més experiència en aquesta pauta: més de 9 milions de segones dosis administrades i més de 23 milions de primeres dosis. La probabilitat observada de presentar una trombosi greu associada a trombocitopènia –poques plaquetes- (l'efecte advers que ha fet canviar les indicacions d'edat) és d'1,7 casos per milió de segones dosis (7 vegades menys que en primeres dosis).

**En aquest cas, en no seguir l'Estratègia estatal, cal un consentiment informat per escrit (en el que es manifesta que no voleu rebre la segona dosi amb una vacuna diferent a la primera, i sol·liciteu que se us administri la vacuna d'Oxford-AstraZeneca) que podeu llegir i descarregar des d'aquest [enllaç](#).**

**Podeu portar el consentiment ja signat al centre vacunal o demanar-ne allí un exemplar per signar-lo.**

### **Com aviseu que us voleu posar la segona dosi amb vacuna d'Oxford-AstraZeneca?**

- Haureu de demanar cita a través del web, portar el consentiment informat signat o signar-lo al punt de vacunació i, un cop arribeu al punt de vacunació, informeu que renuncieu a la vacunació amb Pfizer-BioNTech i demaneu ser vacunats amb Oxford-AstraZeneca.

